

Metronidazole (Flagyl)

What is metronidazole (Flagyl)?

Metronidazole belongs to the family of medicines called anti-infectives. Anti-infectives such as metronidazole are used to treat certain kinds of infections.

How do I take metronidazole (Flagyl)?

There are three different ways to take this medicine depending on the kind of infection you have. The nurse or doctor will tell you which way you should take metronidazole.

1. Metronidazole 2.0 grams as a one time dose. Take all four tablets at one time with a large glass of water.
2. Metronidazole 500 mg twice a day for seven days. Take one tablet two times a day until all of the medicine is gone. For metronidazole to work best, take each tablet about 12 hours apart.
3. Metronidazole 250 mg three times a day for seven days. Take one tablet three times a day until all of the medicine is gone. For metronidazole to work best, take each tablet about eight hours apart.

You will not be cured of your infection until you take all of your medicine, so keep taking metronidazole until all of the tablets are gone, even if your symptoms go away. If you stop taking the medicine too soon, your symptoms can come back.

If you miss a dose, take it as soon as you remember it. Swallow the tablets whole. Do not crush the tablets. If metronidazole upsets your stomach, you may take it with food.

What are the side effects of metronidazole?

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur with metronidazole, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

* Numbness, tingling, pain, or weakness in hands or feet * Convulsions (seizures)

Also, check with your doctor or nurse as soon as possible if any of the following side effects occur:

* Clumsiness or unsteadiness * Rash, hives, redness, itching * Mood or other mental changes

* Sore throat and fever * Vaginal irritation, discharge, or dryness not present before taking this medicine

Other side effects may occur that usually do not require medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. However, check with your nurse or doctor if any of the following side effects continue or become worse:

* Diarrhea * Constipation * Dizziness or lightheadedness * Unusual tiredness or weakness

* Headache * Loss of appetite * Nausea or vomiting * Change in taste sensation

* Stomach pain or cramps * Dryness of mouth * Unpleasant or sharp metallic taste

Other side effects not listed above may also occur in some people. If you notice any other effects, check with your nurse or doctor.

What should I tell the nurse or doctor before I take metronidazole?

To decide on the best treatment for your infection, your nurse or doctor should be told:

1. If you have ever had any unusual or allergic reactions to metronidazole.
2. If you are pregnant. Metronidazole may be taken during pregnancy if clearly needed. However, depending on your infection and your health history, the nurse or doctor may decide to wait until after your first trimester to give you this medicine.
3. If you are breastfeeding. Metronidazole passes into the breast milk and may cause unwanted effects in the baby. If you need to take metronidazole while breastfeeding, you may stop breastfeeding until you finish the medicine. You can use a breast pump and throw the breast milk away. One or two days after you finish the medicine, you may go back to breastfeeding.
4. If you have any of the following medical problems:
* Blood disease or a history of blood disease * Epilepsy * Heart disease * Liver disease
5. If you are taking any other prescription or nonprescription medicine, especially:
* Seldane (terfenadine) * Hismanal (astemizole) * Propulsid (cisapride)
* Anticoagulants (blood thinners) * Disulfiram (Antabuse)

What precautions should I take while using metronidazole?

1. Metronidazole (Flagyl) must not be used while taking either Seldane (terfenadine), Hismanal (astemizole), or Propulsid (cisapride). Serious, life-threatening medical problems can occur if metronidazole is taken while using Seldane, Hismanal, or Propulsid.
2. Do not drink any alcoholic beverages while taking metronidazole! Drinking alcoholic beverages while taking metronidazole can cause stomach pain, nausea, vomiting, headache, and flushing or redness of the face. Other alcohol-containing preparations (such as cold medicine and cough syrup) can also cause problems. These problems can last for at least a day after you stop taking metronidazole. Also, this medicine can cause alcoholic beverages to taste different. Therefore, you should not drink alcoholic beverages or take other alcohol-containing preparations while you are taking metronidazole and for at least a day after your last dose.
3. If you are taking this medicine for a trichomonas infection, the nurse or doctor may want to treat your sexual partner(s) at the same time you are being treated, even if he has no symptoms. This will help keep you from getting the infection back again from your partner(s). Until both you and your partner(s) have finished the medicine, you should not have sex.
4. Keep this medicine out of the reach of children.
5. Do not share this medicine with anyone. Metronidazole can cause problems in some people, especially pregnant women and women who are breastfeeding.

For more information, call the clinic:

or call SC AIDS/STD Hotline

1•800•322•AIDS

2 4 3 7

Metronidazole (Flagyl)

¿Qué es metronidazole?

Metronidazole pertenece a la familia de los medicamentos llamados antiinfecciosos. Los medicamentos como metronidazole son usados para tratar ciertos tipos de infecciones.

¿Cómo debo tomar metronidazole (Flagyl)?

Hay tres maneras diferentes de tomar este medicamento, dependiendo del tipo de infección que usted tenga. La enfermera o doctor le dirán de que forma usted deberá tomar metronidazole:

1. Metronidazole 2.0 gramos dosis única. Tómese las 4 tabletas al mismo tiempo con un vaso grande lleno de agua.
2. Metronidazole 500 mg dos veces al día por siete días. Tómese una tableta dos veces al día hasta que todo el medicamento se termine. Para que metronidazole funcione mejor, usted deberá tomarse una tableta cada 12 horas.
3. Metronidazole 250 mg tres veces al día por siete días. Tómese una tableta tres veces al día por siete días hasta que todo el medicamento se termine. Para que metronidazole funcione mejor, usted deberá tomarse una tableta cada ocho horas.

Usted no se curará de su infección hasta que se termine todo el medicamento. Por lo tanto, continúe tomando metronidazole hasta que todas las tabletas se terminen, aunque sus síntomas hayan desaparecido. Si usted deja de tomar el medicamento antes de lo indicado, sus síntomas podrán regresar.

Si olvida tomarse una dosis, tómesela tan pronto como se recuerde. Tráguese las tabletas enteras. No las parta. Si tiene malestar estomacal al tomar metronidazole, usted deberá tomarlas con comida.

¿Cuáles son los efectos secundarios del metronidazole?

Juntamente con los efectos deseados, este medicamento puede causar efectos indeseados. Aunque no todos los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir con metronidazole, si estos se presentan pueden necesitar atención médica. Consulte con su doctor inmediatamente si alguno de los siguientes efectos secundarios ocurre:

* Adormecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en manos o pies

* Convulsiones (ataques)

También, consulte con su enfermera o doctor tan pronto como sea posible si alguno de los siguientes efectos secundarios ocurre:

* Falta de coordinación/pérdida del equilibrio

* Cambio del estado mental o de ánimo

* Erupciones en la piel, urticaria, enrojecimiento, comezón

* Dolor de garganta y fiebre

* Irritación vaginal, flujo o resequedad que no estaban presentes antes de empezar el tratamiento

Otros efectos secundarios que generalmente no requieren atención médica pueden ocurrir. Estos efectos desaparecerán durante el tratamiento a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte con su doctor o enfermera si alguno de los siguientes efectos secundarios continúa o empeoran:

* Diarrea

* Estreñimiento

* Mareos

* Cansancio o debilidad inusual

* Dolor de cabeza

* Pérdida del apetito

* Náusea o vómito

* Cambios en el gusto

* Dolor o calambres estomacales

* Sequedad en la boca

* Sabor metálico desagradable

Otros efectos secundarios que no se mencionaron arriba pueden ocurrir en algunas personas. Consulte con su enfermera o doctor si nota algún otro efecto secundario.

¿Qué debo decirle a la enfermera o al doctor antes de usar metronidazole?

Para decidir cuál es el mejor tratamiento para usted, su enfermera o doctor debe saber:

1. Si alguna vez usted ha tenido una reacción inusual o alérgica a Metronidazole.
2. Si usted está embarazada. Metronidazole puede ser tomado durante el embarazo si es estrictamente necesario. Sin embargo, dependiendo de su infección e historial médico, la enfermera o el doctor podrán decidir esperar hasta después de su primer trimestre para darle esta medicina.
3. Si usted está amamantando (dándole pecho a su bebé). Metronidazole pasa a la leche materna y puede causar efectos indeseados en el bebé. Si necesita tomar metronidazole mientras está amamantando, usted deberá parar de amamantar hasta que termine la medicina. Usted deberá usar un succionador para sacarse la leche y luego botarla. Uno o dos días después de haber terminado la medicina, usted podrá empezar a amamantar nuevamente.
4. Si usted tiene alguno de los siguientes problemas médicos:
 - * Enfermedad de la sangre o historial de enfermedad de la sangre
 - * Enfermedades del corazón
5. Si está tomando alguna otra medicina recetada o no recetada, especialmente:
 - * Seldane (terfenadina) * Hismanal (astemizole)
 - * Anticoagulantes (medicamentos para hacer la sangre menos espesa)
 - * Epilepsia
 - * Enfermedades del hígado.
 - * Propulsid (cisapride)
 - * Disulfiram (Antabuse)

¿Qué precauciones debo tomar mientras estoy usando metronidazole?

1. Metronidazole (Flagyl) no deberá ser usado si está tomando Seldane (terfenadina), Hismanal (astemizole), o Propulsid (cisapride). Problemas médicos severos que pueden poner en peligro su vida pueden ocurrir si toma metronidazole mientras está usando Seldane, Hismanal, o Propulsid.
2. ¡Usted no deberá beber alcohol mientras está tomando metronidazole! Tomar bebidas alcohólicas mientras está tomando metronidazole puede causarle dolor de estómago, náusea, vómito, dolor de cabeza, y calor/enrojecimiento de la cara. Otras preparaciones que contienen alcohol (como medicinas para la tos y la gripe) también pueden causar problemas. Estos problemas pueden durar varios días después de terminar de tomar metronidazole. Esta medicina también puede hacer que las bebidas alcohólicas separen diferente. Por lo tanto, usted no deberá tomar bebidas alcohólicas u otras preparaciones que contienen alcohol mientras está tomando metronidazole y al menos por un día después de haber terminado de tomarlo.
3. Si usted está tomando esta medicina por una infección de tricomonas, la enfermera o el doctor querrán darle tratamiento a su compañero sexual al mismo tiempo que usted recibe tratamiento, aunque él o ella no tengan ningún síntoma. Esto ayudará a prevenir que su compañero le enferme nuevamente. No deberá tener relaciones sexuales hasta que usted y su compañero hayan terminado todo el tratamiento.
4. Ponga esta medicina fuera del alcance de los niños.
5. No comparta esta medicina con nadie. Metronidazole puede causar problemas en algunas personas, especialmente en mujeres embarazadas y en mujeres que están amamantando.

Para más información, llame a la clínica:

Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS,

Llame a 1-800-CDC-INFO

1-800-232-4636, Para español marque el número 2.